

การปฏิบัติตัวหลังจากได้รับยา

- 1 หลังจากได้รับยาฉีดภายใน 48 ชั่วโมง ปัสสาวะ และอุจจาระของผู้ป่วยอาจมียาปนอยู่ หลังเข้าห้องน้ำควรทำความสะอาดด้วยน้ำมากกว่าปกติ เช่น กดซักครอค 2 ครั้ง
- 2 การรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความรู้สึกขมในปาก การเคี้ยวมากๆ ฝรั่งหรืออมลูกอมจะช่วยบรรเทาอาการได้
- 3 กรณีนอนไม่หลับอาจใช้ยาคลายเครียดตามแพทย์สั่ง
- 4 ควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร ต่อวัน และรับประทานอาหารที่มีเส้นใยหรือไขยาระบายน้ำที่แพทย์สั่งให้ถ้ามีอาการท้องผูก
- 5 สามผ้าปิดจมูก รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ หรืออุ่นร้อนก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงผักสด ผลไม้เปลือกบาง เนื่องจากยาเคมีบำบัดสูตรนี้มีผลทำให้การสร้างเม็ดเลือดต่างๆ ลดลง ทำให้มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7-14 วันหลังรับยา



- 6 หากมีไข้ (วัดปรอททางปากได้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส) ห้องเสีย ปัสสาวะແසบขัด ควรรีบไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากการติดเชื้อในสภาวะที่ภูมิต้านทานต่ำอาจมีความรุนแรงและอันตรายกว่าปกติ
- 7 ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ควรงดเนื้อสัตว์หรืออาหารหมวดโปรตีน (ไข่ นม ถั่วต่างๆ) เพราะอาจทำให้ขาดสารอาหาร และปริมาณเม็ดเลือดน้อยกว่าที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถให้ยาในรอบตั้งไปได้
- 8 หากยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ต้องคุมกำเนิด วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ถุงยางอนามัย กรณีต้องการรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดควรปรึกษาแพทย์
- 9 ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดควรหยุดการใช้สมุนไพร เนื่องจากอาจทำให้มีผลต่อตับและไต และในปัจจุบันยังไม่มีผลการวิจัยที่แสดงอย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อให้คู่กัน
- 10 ยาเคมีบำบัดแบบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงไม่เหมือนกัน โดยอาจมีอาการขณะกำลังได้รับยาเคมีบำบัดหรือภายหลังได้รับยาแล้ว ควรแจ้งผลข้างเคียงของยาที่เกิดให้แพทย์ทราบทุกราย ในการที่ได้รับยาหรือก่อนมารับยาครั้งต่อไป เพื่อที่แพทย์จะได้ช่วยให้การรักษาหรือปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

ติดต่อสอบถาม

- ห้องยาว่องวนิช ชั้น 4 โทร. 0 2256 4538
- หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 2256 4533

สูตรการรักษา

CMF



กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลากาชาดไทย



